

Fungicida

# Cymterra

Ficha técnica

Nº DE REGISTRO: ES-00321

COMPOSICIÓN: Cimoxanilo 45% WG

FORMULACIÓN: Gránulo dispersable en agua (WG)

PRESENTACIÓN: 500 Gr

CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO

27

FUNGICIDA

**Cymterra** es un fungicida penetrante, translaminar de contacto preventivo de contacto que contiene cimoxanilo por lo que puede ejercer una acción curativa durante el periodo de incubación de la enfermedad (1 a 2 días) indicado para el tratamiento del mildiu veloso (Plasmo-para viticola) en vid y mildiu (*Phytophthora infestans*) en patata y tomate.

## APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis Kg/ha	Nº aplic. (interv días)	Vol Caldo (l/ha)	Estadio Aplicación <sup>(1)</sup>	P.S.
Patata	Mildiu ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0,27	8 (7 - 10)	200 - 1000	BBCH 21-95	7
Tomate	Mildiu ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0,27	5 (7)	200 - 1000	BBCH 13-87	3 (consumo fresco) 7 (industrial)
Vid	Mildiu ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0,27	4 (7-10)	200 - 1000	BBCH 13/14-85	28

<sup>(1)</sup> B BBCH 21-95: desde 1er brote basal lateral visible (>5 cm) hasta 50% de las hojas de color marrón.

BBCH 13-87: desde la 3ra hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta el 70% de los frutos muestra el color típico de madurez.

BBCH 13/14-85: desde la 3ra hoja desplegada hasta el ablandamiento de las bayas.

P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.



NATURAGRI  
SOLUCIONES

C/ Montalbán 3, 3º izda. • 28014 Madrid. ESPAÑA

Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es