

Mancotan

Ficha técnica

Fungicida

Nº DE REGISTRO: 25.776

COMPOSICIÓN: Mancozeb 50% SC

**CLASIFICACIÓN DEL MODO
DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):**

GRUPO

M3

FUNGICIDA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

PRESENTACIÓN: 5 L



NATURAGRI
S O L U C I O N E S

C/ Montalbán 3, 3º izda. • 28014 Madrid. ESPAÑA

Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es

Mancotan es un fungicida preventivo de contacto para distintos cultivos.

Mancozeb es un compuesto que contiene maneb y cinc (20 % de manganeso y 2,5 % de cinc).

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Aire libre/ invernadero	Agente	Dosis L/ha	Nº Máx. trat	P.S
Ajo, cebolla y chalote	Aire libre	Alternaria, Mildiu	3	3	N.P.
Cereales (avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale)	Aire libre	Roya	3	2	N.P.
Bulbos de ornamentales	Aire libre	Botritis	3	4	7
Espárrago	Aire libre	Roya	3	4	N.P.
	Invernadero	Roya	3	4	N.P.
Judías	Aire Libre	Roya	3	1	N.P.
Habas	Aire Libre	Roya, Mildiu	3	1	N.P.
Manzano y peral	Aire Libre	Moteado	1,8	4	N.P.
Ornamentales herbáceas	Aire Libre	Mildiu, Roya	5,6	4	14
Ornamentales leñosas (*)	Aire Libre	Moteado	2,4-3,2 (*)	4	14
Patatas de consumo	Aire Libre	Alternaria, Mildiu	3	8	N.P.
Patatas de siembra	Aire Libre	Alternaria, Mildiu	3	12	N.P.
Puerros	Aire Libre	Alternaria, Mildiu	3	3	N.P.
Vid	Aire Libre	Black Rot, Brenner (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>) y Mildiu	2	4	14

(*) Ornamentales leñosas: Realizar como máximo 4 aplicaciones. Prefloración: 2,4 l/ha. Antes, durante y Post-floración: 3,2 l/ha.

P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización con tractor y manual para todos los usos autorizados, excepto en patatas de siembra y de consumo y cereales, que se aplicará, mediante pulverización con tractor, y en espárrago en invernadero, que sólo se realizará mediante pulverización manual.

Nunca aplique el producto en cultivos húmedos o cuando exista la probabilidad de lluvia en un periodo de 6 horas.