

NaturMar 100%

Ficha técnica



Bioestimulante

COMPOSICIÓN:

Ascophyllum nodosum 100% SL

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

PRESENTACIÓN: 5 L



NATURAGRI
S O L U C I O N E S

C/ Montalbán 3, 3º izda. • 28014 Madrid. ESPAÑA

Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es

NaturMar 100% optimiza la nutrición en el momento de la floración y el cuajado del cultivo y el número de frutos por planta.

APLICACIONES

Se realizarán de 2 a 4 aplicaciones a diferentes dosis según el cultivo para la mejora del cuajado y aumento del rendimiento y tamaño de fruto en general.

FRUTALES

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1 L/ha.

Se recomiendan 3 aplicaciones localizadas en prefloración, plena floración y final de floración.

CUCURBITÁCEAS

Pepino, calabacín y pepinillo

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 0,75-1 cc/L.

Momento de aplicación:

Realizar una primera aplicación en el momento entre el trasplante y la primera hoja, después cada 10 días hasta un máximo de 4 aplicaciones.

Sandía y melón

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar una primera aplicación en floración temprana del cultivo, repitiendo éstas cada 2 semanas hasta un máximo de 3 aplicaciones.

SOLANÁCEAS

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1 cc/L.

Momento de aplicación:

Realizar una primera aplicación con la aparición de las primeras flores, después cada 10 ó 15 días hasta un máximo de 3 aplicaciones.

BERRIES

Fresa

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar 3 aplicaciones a lo largo de la floración del cultivo (floración temprana / mitad de floración / final de floración).

Arándano

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 0,8 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar 4 aplicaciones desde inicio de floración hasta caída de pétalos (floración temprana / mitad de floración / final de floración / caída de pétalos).

CULTIVOS DE HOJA

En cultivos de hoja el producto es utilizado para lograr el incremento de peso del cogollo.

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar una primera aplicación con el cultivo con 4 - 6 hojas, repetir después cada 10 días hasta un máximo de 4 aplicaciones en función de la longitud del ciclo del cultivo.

ALIÁCEAS

Ajo

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1,25 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar una primera aplicación con 4 hojas verdaderas y una segunda con 10 hojas verdaderas.

Cebolla

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1,25 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar una primera aplicación con 5 - 6 hojas verdaderas y una segunda 3 semanas después.

VID

En vid, el producto es utilizado para asegurar una mejor floración paliando el efecto de las condiciones climatológicas.

Aplicar en pulverización foliar a dosis de 1,7 L/ha.

Momento de aplicación:

Realizar 3 aplicaciones desde que se separan las inflorescencias hasta el cuajado (Inflorescencias separadas/floración temprana/cuajado de fruto).

OBSERVACIONES

Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Consulte a nuestro servicio técnico para otros usos y cultivos.