

Nautile®

Ficha técnica

Nº DE REGISTRO: 24.027

FORMULACIÓN: Granulado dispersable en agua (WG)

COMPOSICIÓN: Cimoxanilo 5% + Mancozeb 68% WG

PRESENTACIÓN: 5 Kg

CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO

27 3M

FUNGICIDA

Nautile® es un fungicida de aplicación foliar para tomate y patata. **Nautile®** es una asociación de dos materias activas complementarias (Cimoxanilo y Mancozeb) que combina la acción penetrante, preventiva, sistémica local, erradicante y curativa del Cimoxanilo con la acción de contacto y preventiva del Mancozeb.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis	P.S.
Patata	Alternaria, Mildiu	2 kg/ha	14
Tomate	Mildiu	2 kg/ha	3

PS (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

Aplicar en pulverización foliar normal a dosis de 2 kg/ha usando un volumen de caldo de 200 a 1000 l/ha. Dosificar en el tanque del pulverizador y, añadir la cantidad de agua adecuada, con el agitador en funcionamiento. Pulverizar inmediatamente después de realizar la mezcla. Procurar una cobertura homogénea de todo el cultivo para conseguir unos buenos resultados.

- **Patata:** realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre las mismas mediante pulverización con tractor desde el primer brote basal visible hasta que el 50% de las hojas tengan color marrón (BBCH 21, BBCH 95).
- **Tomate:** realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre las mismas. En tomate de industria se podrán realizar 3 aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 9 días entre las mismas. Aplicar mediante pulverización con tractor desde 3-4 hojas del tallo principal desplegadas hasta que el 50-70% de los frutos muestre el color típico de la madurez (BBCH 13-14, BBCH 85-87).

