

Transprid

Ficha técnica

Nº DE REGISTRO: ES-00876

FORMULACIÓN: Gránulos solubles en agua (SG)

COMPOSICIÓN: Acetamiprid 20% p/p SG

PRESENTACIÓN: 600 gr

CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO

4A

INSECTICIDA

Transprid es un insecticida sistémico a base de acetamiprid con acción translaminar y actividad por contacto e ingestión para su uso en colza, frutales de pepita y hueso. Acetamiprid es un insecticida neonicotinoide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto causando parálisis.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis (kg/ha)	P.S. (días)
Colza	Meligethes aeneus	0,2	42
Manzano, Melocotonero, Peral	Pulgones	0,25	14

P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar mecánica o manual. Cuando se aplica con tractor se realizará en cabina cerrada. Aplicar a las dosis indicadas en la tabla cuando aparezcan signos de infestación siguiendo las siguientes recomendaciones:

Colza: Realizar una única aplicación en presencia de la plaga, antes del final de la floración (BBCH 69), utilizando un volumen de caldo de 400-600 l/ha.

Manzano y Peral: Excepto contra las especies *E. lanigerum* y *A. spiraeicola*. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días.

Melocotonero: Aplicar en presencia de la plaga antes del estadio BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 1 aplicación.

Preparación de la mezcla, aplicación y limpieza.

No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento. Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la agitación. Añadir la cantidad de **Transprid** necesaria para la superficie a tratar y completar con agua. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.

