

Cithrotiol® Liquido

Ficha técnica



Fungicida

Nº DE REGISTRO: 25.055

COMPOSICIÓN: Azufre 82,5% SC

CLASIFICACIÓN DEL MODO
DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO	M2	FUNGICIDA
-------	----	-----------

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

PRESENTACIÓN: 10 L



NATURAGRI
SOLUCIONES

Glorieta de Bilbao, 1, 1º dcha. • 28004 Madrid. ESPAÑA
Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es

Cithrotiol® Líquido Fungicida

Cithrotiol® Líquido es un preparado a base de azufre en forma de suspensión concentrada que se caracteriza por su buena adherencia sobre la superficie vegetal. Está formulado con la Tecnología "Rain Free Formulation" la cual, optimiza el reparto de la materia activa sobre la superficie y, mejora la resistencia del tratamiento al lavado por lluvia. Actúa como fungicida no sistémico de acción preventiva con efecto secundario sobre ácaros.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic máx.	Intervalo	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Acelga	Oídio de la remolacha, <i>Erysiphe betae</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Achicoria (hojas)	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Ajete, ajo tierno	Oídios, <i>Erysiphaceae</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Apio	Oídio de la zanahoria, <i>Erysiphe heraclei</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Apionabo	Oídio de las crucíferas, <i>Erysiphe cruciferarum</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Barbarea	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Berenjena	Oídio del tomate, <i>Oidium neolycopersici</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Berro de agua	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Berro, mastuerzo	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Berza , col	Oídio de las crucíferas, <i>Erysiphe cruciferarum</i>	0,25 - 0,6	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Borraja	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Bulbos hortícolas	Oídios, <i>Erysiphaceae</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Canónigo	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Cardo	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Chirivía	Oídio de la zanahoria, <i>Erysiphe heraclei</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Colinabo	Oídios, <i>Erysiphaceae</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Cucurbitáceas	Oídio de las cucurbitáceas, <i>Podosphaera xanthii</i>	0,5 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Diente de león	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Endibia	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Escarola	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Espárrago	Oídios, <i>Erysiphaceae</i>	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Espinaca	Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Fresal	Oídio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i>	0,25 - 0,7	8	10-14	500 -1000	BBCH 57-87

Cithrotiol® Liquido

Fungicida

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic máx.	Intervalo	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Lechuga	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Mostaza china	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Nabo	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Pataca, aguaturma, tupinambo	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Puerro	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Rábano rusticano	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Rábano	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Raíz de perejil	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Remolacha azucarera	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,2 - 0,5	2	Mín. 14 días	600-1.000	Aplicar desde BBCH 39 (cobertura del cultivo finalizada) hasta BBCH 49 (la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha).
Remolacha de mesa	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Remolacha forrajera	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Rúcula	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Ruibarbo	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Salsifí	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Tomate	Oídio, oídioopsis, Leveillula taurica	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87
Verdolaga	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,25 - 0,4	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-85
Zanahoria	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 13-87

Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.

Cithrotiol® Liquido

Fungicida

Aire libre

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic máx.	Intervalo	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Almendro	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,5 - 1	8	7	500 -1000	BBCH 57-97
	Oídio del rosál, Podosphaera pannosa					
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-59
Avellano	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97
	Oídio del avellano, Phyllactinia guttata					
Castaño	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97
	Oídio, Microsphaera penicillata					
Frutales de hueso	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97
	Podosphaera spp					
Frutales de pepita	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-85
	Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha					
Guisante para grano	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Guisante proteaginoso /forrajero	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Guisante verde	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Haba forrajera	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Haba para grano	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Haba verde	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Higuera	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7	500 -1200	BBCH 57-85
	Oídios, Erysiphaceae					
Hinojo	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 16-47
Judía forrajera	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Judía para grano	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Judía verde	Erysiphe spp	0,25 - 0,7	8	7-14	500 -1000	BBCH 39-85
Nogal	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7	500 -1200	BBCH 57-85
	Oídio, Microsphaera penicillata					
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,25 - 0,7	3	7-14	500 -1200	BBCH 71-97
	Negrilla, fumagina, Capnodium elaeophilum					
Pacano, nuez de pecán	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97
	Oídios, Erysiphaceae					
Pinos	Ácaros eriófidos, Eriophyidae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97
	Oídios, Erysiphaceae					
Pistachero	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 0,65	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97
Plantaciones tropicales y subtropicales	Oídios, Erysiphaceae	0,2 - 0,5	8	7-14	500 -1200	BBCH 57-97

Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.

Cithrotiol® Liquido

Fungicida

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic máx.	Intervalo	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Vid	Erinosis de la vid, Colomerus vitis	0,25 - 0,8	8	10-14	500 -1500	BBCH 13-81
	Oídio de la vid, Erysiphe necator					

Aire libre. Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic máx.	Intervalo	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Arroz	Piricularia del arroz, Pyricularia oryzae	3,75 - 7,5	3	7	100 -500	BBCH 32-65
Cereales de invierno / primavera	Oídio de los cereales, Blumeria graminis	0,25 - 1	Máx. 2	Mín. 14	600 -1000	BBCH 31-59
Nabo	Oídios, Erysiphaceae	0,25 - 1	Máx. 2	Mín. 14	600 -1000	BBCH 31-59

CONDICIONES GENERALES DE USO

Tratamiento fungicida preventivo por pulverización foliar mecánica al aire libre, y manual (lanza/pistola o mochila) al aire libre e invernadero. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.- Enjuague cada recipiente de pesticida vacío varias veces, vierta la solución de enjuague en la mezcla del tanque de aspersión.- Aplicar variando la dosis según temperatura ambiental, época de tratamiento, cultivo.- No efectuar el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas.- No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.- No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.- No deberán efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al del azufre.

PLAZOS DE SEGURIDAD

No procede fijar plazos de seguridad.