

Colpenn®

Ficha técnica



Fungicida

Nº DE REGISTRO: 11.179

COMPOSICIÓN: Azufre 80% WG

CLASIFICACIÓN DEL MODO
DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO	M2	FUNGICIDA
-------	----	-----------

FORMULACIÓN:

Granulado dispersable en agua (WG)

PRESENTACIÓN: 1 - 5 - 25 Kg



NATURAGRI
S O L U C I O N E S

Glorieta de Bilbao, 1, 1º dcha. • 28004 Madrid. ESPAÑA
Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es

Colpenn® es un preparado a base de azufre, formulado con la tecnología Disperss®, formulación optimizada para facilitar las mezclas en tanque y aumentar la adherencia sobre la superficie vegetal, evitando el lavado por lluvia o riego. Colpenn® actúa como fungicida no sistémico de acción preventiva y tiene un efecto secundario sobre ácaros.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic.	Intervalo días	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Acelga	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Achicoria [hojas]	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Ajete, ajo tierno	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Alcachofa	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Almendro	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,5 - 1	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 57-97
Apio	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oídio, Araña roja	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 16-59
Avellano	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	500 -1200	BBCH 57-97
Barbarea	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Berenjena	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,75	1-8	7	500 -1000	BBCH 13-87
Berro de agua	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Berro, mastuerzo	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Borraja	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Bulbos hortícolas	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 16-47
Canónigo	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Cardo	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Castaño	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	500 -1200	BBCH 57-97
Cereales de invierno / primavera	Oidio de los cereales, Blumeria graminis	0,25 - 0,6	1-2	14	Uso profesional: 600-833 l/ha Uso no profesional: 6-8,33 l/100 m ²	BBCH 31-59
Cucurbitáceas	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 13-87
Diente de león	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Endibia	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Escarola	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-85
Espárrago	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Espinaca	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha Uso no profesional: 5-6,66 l/100 m ²	BBCH 13-85

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic.	Intervalo días	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Fresal	Oídio, Podosphaera aphanis	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 57-87
Frutales de hueso	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1200 l/ha Uso no profesional: 5-12 l/100 m ²	BBCH 57-97
Frutales de pepita	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1200 l/ha Uso no profesional: 5-12 l/100 m ²	BBCH 57-85
Guisante para grano	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Guisante proteaginoso /forrajero	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Guisante verde	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Haba forrajera	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Haba para grano	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Haba verde	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Higuera	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	500 -1200	BBCH 57-85
Hinojo	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500 -666	BBCH 13-49
Hortalizas del género Brassica	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	Uso profesional y pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y pulverización manual con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 13-85
Judía forrajera	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Judía para grano	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85
Judía verde	Eriofidos, Araña roja, Erysiphe spp.	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 39-85

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic.	Intervalo días	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Lechuga	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha Uso no profesional: 5-6,66 l/100 m ²	BBCH 13-49
Lúpulo	Araña roja común, Tetranychus spp. Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 1000-1600 l/ha Uso no profesional: 5-16 l/100 m ²	BBCH 13-49
Mostaza china	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha	BBCH 13-85
Nogal	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1200 l/ha	BBCH 57-97
Olivo	Negrilla, fumagina, Capnodium elaeophilum	0,25 - 0,75	1-3	7	Uso profesional: 500-1333 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m ²	BBCH 71-92
Pacano, nuez de pecán	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1200 l/ha	BBCH 57-97
Pinos	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1200 l/ha	BBCH 57-97
Pistachero	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1200 l/ha	BBCH 57-97
Plantaciones tropicales y subtropicales	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,7	1-8	7	Uso profesional: 500-1143 l/ha Uso no profesional: 5-11,43 l/100 m ²	BBCH 57-97
Puerro	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500-666	BBCH 13-49
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 13-87
Remolacha azucarera	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,25 - 1,25	1-2	14	Uso profesional: 600-1000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m ²	BBCH 39-49
Remolacha de mesa	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,25 - 1,25	1-2	14	Uso profesional: 600-1000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m ²	BBCH 39-49
Remolacha forrajera	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,25 - 1,25	1-2	14	Uso profesional: 600-1000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m ²	BBCH 39-49

Cultivo	Agente	Dosis %	Nº aplic.	Intervalo días	Vol Caldo (L/ha)	Momento de aplicación
Rúcula	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,25 - 0,6	1-8	7	Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha Uso profesional y aplicación mediante pulverización normal con mochila y lanza/pistola: 500 -666 l/ha	BBCH 13-85
Ruibarbo	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500-666	BBCH 13-49
Tomate	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,75	1-8	7	Uso profesional: 500-1000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	BBCH 13-87
Verdolaga	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,6	1-8	7	500-666	BBCH 13-85
Vid	Oídio, Eriofidos, Araña roja	0,25 - 0,8	1-8	10	Uso profesional: 500-1500 l/ha Uso no profesional: 5-15 l/100 m ²	BBCH 13-81

* Dosis máxima de producto por aplicación:

- 7,5 kg/ha en arbustos ornamentales, cucurbitáceas, fresas, guisantes, hortalizas de bulbo, judías, otras raíces hortícolas, remolacha, tomate.
- 5 kg/ha en cereales.
- 4 kg/ha en coles, hortícolas de hoja.
- 8 kg/ha en frutales de hueso y pepita.
- 7,8 kg/ha en frutales subtropicales/tropicales
- 12 kg/ha en lúpulo, vid.
- 10 kg/ha en olivo