Fungicida

Pikar®

Ficha técnica

Nº DE REGISTRO: 21.396

FORMULACIÓN: Concentrado soluble (SL)

COMPOSICIÓN: Propamocarb 60,5% (Clorhidrato) SL

PRESENTACIÓN: 1 – 5 L

CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC): GRUPO 28 FUNGICIDA

Pikar® es un fungicida sistémico con actividad preventiva para aplicación en pulverización foliar, humectación del suelo o a través del sistema de riego por goteo. Resulta eficaz en el control de mildiu y en el control de pudriciones de cuello y raíces causadas por *Pythium y Phytophthora*.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Control de pudriciones de cuello y raíces causadas por Pythium y Phytophthora:

Cultivo	Método de Aplicación	Dosis de Uso	Modo de Empleo
Semilleros de hortícolas. Suelos de semilleros hortícolas. Suelos de semilleros sin planta	Humectación del suelo de forma pre-ventiva antes de la siembra.	5-10 ml/m^2: 3-6 litros de una solución al 0,15% (15 ml de Pikar en 10 litros de agua/m^2).	Repetir al cabo de 1-2 semanas dependiendo de la presión del hongo. Mojar bien el suelo/sustrato con la solución. Enjuagar las hojas mojadas con agua.
Tomate, pimiento y berenjena. Pepino y calabacín. Melón y sandía.	Aplicación a través del riego por goteo (aplicaciones al aire libre o en invernadero, tanto en suelo natural como sustrato).	2 litros de Pikar/ha en 500-1500 l/ha de caldo.	Aplicación preventiva en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Realizar, como máximo, 4 aplicaciones de Pikar por ciclo de cultivo, a intervalos de 7-15 días

Control de mildiu en planta adulta:

Cultivo	Método de Aplicación	Dosis de Uso	Modo de Empleo
Pepino y calabacín. Melón y sandía.	Pulverización foliar (aplicaciones al aire libre, tanto en suelo natural como sustrato).	3 litros de Pikar/ha en 300-1500 l/ha de caldo.	Empezar las aplicaciones cuando se observe el primer síntoma de ataque de mildiu, con un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, y un intervalo de 10 días entre aplicaciones.
Lechuga	Pulverización foliar (aire libre o invernadero).	1.5 l de Pikar/ha en 400-1500 l/ha de caldo.	Empezar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas del ataque de mildiu, con un máximo de 2 aplicaciones por período vegetativo, y un intervalo de 10 días entre aplicaciones.

P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.

NATURAGRI
SOLUCIONES

Glorieta de Bilbao, 1, 1º dcha. • 28004 Madrid. ESPAÑA
Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es